

Échelle de dépistage des troubles du sommeil de l'enfant de 4 à 16 ans ^(1,2)

Prénom de l'enfant :
 Nom de l'enfant :

Date de naissance : / /
 Sexe : Garçon Fille

Taille :
 Poids :



Pour répondre à ce questionnaire, basez-vous sur les observations que vous avez pu faire durant les six derniers mois et cochez les cases qui correspondent le mieux à ce que vous avez observé de votre enfant. Merci de répondre à toutes les questions en remplissant les lignes ou en entourant les nombres

	Plus de 9h	8h à 9h	7h à 8h	5h à 7h	Moins de 5h	A	B	C	D	E
1 - Combien d'heures l'enfant dort-il la plupart des nuits ?	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<input type="checkbox"/>				
	Moins de 15 min	15-30 min	30-45 min	45-60 min	Plus de 60 min					
2 - Combien de temps après sa mise au lit l'enfant met-il habituellement pour s'endormir ?	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<input type="checkbox"/>				
	Jamais	Rarement 1 à 3 fois / mois	Parfois 1 à 2 fois / semaine	Souvent 3 à 5 fois / semaine	Toujours Tous les jours					
3 - L'enfant va au lit avec réticence	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<input type="checkbox"/>				
4 - L'enfant a des difficultés à s'endormir	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<input type="checkbox"/>				
5 - L'enfant ressent de l'anxiété ou des peurs au moment de s'endormir	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<input type="checkbox"/>				
6 - Lorsque l'enfant s'endort, il semble vivre ses rêves	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<input type="checkbox"/>				
7 - L'enfant transpire excessivement à l'endormissement	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<input type="checkbox"/>				
8 - L'enfant se réveille plus de 2 fois par nuit	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<input type="checkbox"/>				
9 - L'enfant a des difficultés à s'endormir à nouveau après s'être réveillé dans la nuit	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<input type="checkbox"/>				
10 - Dans son sommeil, l'enfant a des mouvements brusques ou des secousses des jambes ou il change souvent de position durant la nuit ou encore il jette les couvertures au pied de son lit	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<input type="checkbox"/>				
11 - L'enfant a des difficultés à respirer durant la nuit	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<input type="checkbox"/>				
12 - L'enfant fait des pauses respiratoires ou cherche sa respiration pendant son sommeil	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<input type="checkbox"/>				
13 - L'enfant ronfle	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<input type="checkbox"/>				
14 - L'enfant transpire excessivement pendant la nuit	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<input type="checkbox"/>				
15 - Vous avez assisté à un épisode de somnambulisme de l'enfant (il se lève et déambule pendant son sommeil)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<input type="checkbox"/>				
16 - Vous avez déjà entendu l'enfant parler dans son sommeil	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<input type="checkbox"/>				
17 - L'enfant grince des dents pendant son sommeil	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<input type="checkbox"/>				
18 - L'enfant se réveille en hurlant ou est confus au point qu'il est impossible de l'approcher, mais il n'a aucun souvenir de ces événements le matin suivant	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<input type="checkbox"/>				
19 - L'enfant fait des cauchemars dont il ne se rappelle pas le matin venu	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<input type="checkbox"/>				
20 - L'enfant est difficile à réveiller le matin	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<input type="checkbox"/>				
21 - L'enfant se réveille le matin en se sentant fatigué	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<input type="checkbox"/>				
22 - L'enfant se sent incapable de bouger quand il se réveille le matin	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<input type="checkbox"/>				
23 - L'enfant est somnolent durant la journée	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<input type="checkbox"/>				
24 - L'enfant s'endort brutalement, de façon inattendue, à l'école ou lors de ses activités	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<input type="checkbox"/>				
25 - Lorsque l'enfant rit, il a une perte de tonus musculaire qui peut entraîner un affaissement du corps ou une chute	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	<input type="checkbox"/>				

Facteurs	Sommes	Scores	Seuils	Normes			Sous-scores				
				Moyenne	Écart-type	Q1 et Q3	A	B	C	D	E
Troubles du sommeil	1 à 25 (sur 125)	>45 <input type="checkbox"/>	38	8,8	32-44	<input type="checkbox"/>				
A. Insomnies	1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 (sur 35)	>21 <input type="checkbox"/>	12	4,2	9-14	<input type="checkbox"/>				
B. Parasomnies	6, 10, 15, 16, 17, 18, 19 (sur 35)	>17 <input type="checkbox"/>	10	3	8-12	<input type="checkbox"/>				
C. Problèmes respiratoires	7, 11, 12, 13, 14 (sur 25)	>12 <input type="checkbox"/>	6	2,4	5-8	<input type="checkbox"/>				
D. Sommeil non réparateur	20, 21, 22 (sur 15)	>11 <input type="checkbox"/>	5	2,5	4-7	<input type="checkbox"/>				
E. Somnolence diurne excessive	23, 24, 25 (sur 15)	>5 <input type="checkbox"/>	3	0,8	3-3	<input type="checkbox"/>				

Ces scores ne peuvent en aucun cas remplacer le diagnostic d'un spécialiste du sommeil. Si les scores A, C ou E > seuils, consultez un spécialiste.

1. Bruni O, et al. The Sleep Disturbance Scale for Children (SDSC). Construction and validation of an instrument to evaluate sleep disturbances in childhood and adolescence. J Sleep Res. 1996;5(4):251-61.
 2. Putois B, et al. The French Sleep Disturbance Scale for Children. Sleep Med. 2017; 32:56-65.